



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΠ ΤΟΥ ΠΓΝ “ΑΤΤΙΚΟΝ”

Χ. Σάνδηλος, Ι. Κοντογιωργάκη, Ε. Χυτήρογλου, Ν. Γκαβογιαννάκης, Ξ. Αγγελίδης, Κ. Χλίβα, Μ. Μακρής

Μονάδα Αλλεργιολογίας «Δ.Καλογερομήτρος»

Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ Αττικών, Αθήνα



Εισαγωγή:

Αν και οι αναφυλακτικές αντιδράσεις αποτελούν συχνό αίτιο προσέλευσης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)¹, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη συχνότητα και τα αίτια τους.

Σκοπός:

Η καταγραφή περιστατικών αναφυλαξίας που αντιμετωπίστηκαν στο ΤΕΠ του ΠΓΝ “Αττικών” στις γενικές εφημερίες και για διάστημα ενός ημερολογιακού έτους.


Υλικό-Μέθοδοι:

Πραγματοποιήθηκε αναδρομική καταγραφή των περιστατικών που καταγράφηκαν στο βιβλίο εφημερίας της Μονάδας Αλλεργιολογίας «Δ. Καλογερομήτρος» το διάστημα 01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 και αφορούσαν ασθενείς ηλικίας ≥ 14 ετών. Η γενική εφημερία του νοσοκομείου «Αττικό» είναι 24ωρης διάρκειας ανά 4 ημέρες. Η διάγνωση της αναφυλαξίας έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια του EAACI Taskforce on Anaphylaxis. Επιδημιολογικά δεδομένα, το αίτιο της αντίδρασης και οι κλινικές εκδηλώσεις συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση.


Αποτελέσματα:

Το εν λόγω διάστημα εξετάστηκαν 85 ασθενείς στους οποίους τεκμηριώθηκε αναφυλακτική αντίδραση σε σύνολο 846 ασθενών που εξετάστηκαν από το αλλεργιολογικό τμήμα με (85/846, 10,01%), εκ των οποίων 52 (61,2%) ήταν γυναίκες. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 41,01 (φάσμα ηλικιών από 14 έως 79 ετών) έτη.


Τροφικά και φαρμακευτικά αίτια ήταν τα συχνότερα εκλυτικά αίτια που καταγράφηκαν (38,8 και 40 % αντίστοιχα)



Δερματικά συμπτώματα παρατηρήθηκαν σχεδόν από το σύνολο των ασθενών (83 ασθενείς, 97,6%) ενώ το 54,1% των ασθενών εμφάνισαν συμπτώματα και από το ΓΕΣ. Λιγότερο συχνά καταγράφηκαν συμπτώματα από το αναπνευστικό (45,9%) και το καρδιαγγειακό (31,8%) αντίστοιχα.




Η μέση ηλικία των ασθενών με αναφυλαξία από φαρμακευτικό αίτιο ήταν υψηλότερη σε σχέση με αυτή των ασθενών με τροφικό αίτιο (44,6 vs 32,9 έτη αντίστοιχα, $p=0,042$).



Η παρουσία καρδιαγγειακών συμπτωμάτων εμφάνιζε συσχέτιση με αναφυλαξία φαρμακευτικής αιτιολογίας ($p=0,016$).

Ασθενείς με συμπτώματα από το καρδιαγγειακό



Συμπεράσματα:

Από την μάζητη πληθυσμού ασθενών με αναφυλαξία που επισκέφτηκε το ΤΕΠ του Νοσοκομείου «Αττικών», τα φάρμακα αναγνωρίστηκαν ως το συχνότερο εκλυτικό αίτιο, ενώ ακολούθησαν τα τρόφιμα. Επιπρόσθετα, η φαρμακευτική αναφυλαξία φαίνεται να προσβάλλει ασθενείς υψηλότερης μέσης ηλικίας ($p=0,042$) προκαλώντας συμπτώματα από το καρδιαγγειακό συχνότερα σε σχέση με αναφυλαξίες άλλης αιτιολογίας ($p=0,016$). Στα αξιολόγηση των συμπερασμάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο πληθυσμός μας συμπεριλάμβανε άτομα ηλικίας ≥ 14 ετών.

