

# ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ

Καψούλη Φωτεινή, Μήκος Νικόλαος, Κομπότη Ευαγγελία

Αλλεργιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Οι δοκιμασίες πρόκλησης αποτελούν τη 'gold standard' διαγνωστική μέθοδο για τις αλλεργικές αντιδράσεις σε αντιβιοτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η ανοχή σε εναλλακτικό αντιβιοτικό ή να αποκλεισθεί αλλεργική αντίδραση όταν το ιστορικό είναι ασαφές και ο υπόλοιπος διαγνωστικός έλεγχος αρνητικός. Οι αρνητικές δοκιμασίες πρόκλησης επιτρέπουν την επαναχορήγηση ενός αντιβιοτικού σε κάποιο ασθενή. Η πραγματική χρησιμότητά τους βέβαια είναι σχετική.

## ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ:

Διερευνήθηκαν 52 ενήλικες ασθενείς του Αλλεργιολογικού τμήματος του Λαϊκού Νοσοκομείου με επιτυχείς δοκιμασίες πρόκλήσεων σε αντιβιοτικά και πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις με 41 ενήλικους ασθενείς (32/41, 78% γυναίκες).

Οι ασθενείς ερωτήθηκαν σχετικά με το αν θυμούνται τη διαδικασία της πρόκλησης, το αντιβιοτικό στο οποίο πραγματοποιήθηκε και την ανάγκη και λήψη του μετέπειτα. Επίσης, και την εμφάνιση αντίδρασης σε κάποιο καινούριο φάρμακο.

Συνολικά διερευνήθηκαν 58 πρόκλησεις σε διάφορα αντιβιοτικά. Σε 9/58 περιπτώσεις χρειάστηκε και έγινε λήψη του αντιβιοτικού της πρόκλησης αργότερα. Επίσης, 3 ασθενείς ανέφεραν αντίδραση σε κάποιο καινούριο φάρμακο.

Σύνολο ασθενών: 52



Δοκιμασίες Πρόκλησης:

Σύνολο 58



- Γυναίκες που απάντησαν
- Άνδρες που απάντησαν
- Ασθενείς που δεν απάντησαν

- Χρειάστηκε και το έλαβαν
- Δεν χρειάστηκε να το λάβουν

Σε 19/58 περιπτώσεις η πρόκληση ήταν σε κεφουροξίμη και αφορούσε σε ασθενείς με ιστορικό αντίδρασης σε άλλο Β-λακταμικό (πενικιλίνη, αμοξικιλίνη, κεφακλόρη, κεφπροζίλη, κεφτριακόνη). Μόνο ένας ασθενής χρειάστηκε και έλαβε αργότερα κεφουροξίμη.

Σε 11/58 περιπτώσεις η πρόκληση ήταν σε αμοξικιλίνη και αφορούσε σε ασθενείς με ιστορικό αντίδρασης σε άλλο Β-λακταμικό (κεφαλοσπορίνες: κεφουροξίμη, κεφακλόρη, κεφταζιδίμη) ή ιστορικό άτυπης μη αλλεργικής αντίδρασης. Από αυτές, σε 6 περιπτώσεις ο ασθενής χρειάστηκε και έλαβε αργότερα αμοξικιλίνη.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις προκλήσεων, που ήταν σε άλλα αντιβιοτικά δεν προέκυψε ανάγκη επαναχορήγησης, αλλά σχεδόν όλοι οι ασθενείς δήλωσαν ότι θα λάμβαναν το αντιβιοτικό της πρόκλησης, αν το σύστηνε ιατρός, ενώ σε μόνο μία περίπτωση ο ασθενής δήλωσε ότι δεν θα το λάμβανε λόγω φόβου παρά την αρνητική δοκιμασία πρόκλησης και την απελευθέρωση του αντιβιοτικού.

**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:** Οι δοκιμασίες πρόκλησης είναι αδιαμφισβήτητα ένα σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο αλλά η κάλυψη των αναγκών των ασθενών εξαρτάται τόσο από τις επιλογές των θεραπόντων ιατρών όσο και από τις εκάστοτε ιατρικές συνθήκες.

Συσχέτιση Πρόκλησης - Ανάγκη Λήψης Αντιβιοτικού

